

DanHep – Brugsanvisning

Accept af forskningsprojektet

Nedenfor beskrives en trinvis fremgangsmåde for patienters deltagelse i DanHep forskningsprojektet.

Modulet virker når best./ord placeres via et ordinationsæt.

1. Når et ordinationssæt anvendes og Daltaprin (Fragmin)/Tinzaparin (Innohep) vælges.

▼ Lægemidler

- ▶ Syrepumpehæmmere
- ▶ GYN. Antiemetika
- ▶ Laksantia
- ▼ Tromboseprofylakse
 - ☒ tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Morgen, Første dosis i morgen kl. 08:00, Sidste dosis søn. 13-04 kl. 08:00, Præop - På operationsdag
Indikationer: tromboseprofylakse
Signer & tilbagehold
 - ☐ tinzaparin injektion, sprøjte
4.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Morgen, Præop - På operationsdag Indikationer: tromboseprofylakse
 - ☐ tinzaparin injektion, sprøjte
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, aften, Postop - Opvågning og afdeling Indikationer: tromboseprofylakse
 - ☐ tinzaparin injektion, sprøjte
4.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, aften, Postop - Opvågning og afdeling Indikationer: tromboseprofylakse
 - ☐ dalteparin injektion, sprøjte
2.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Morgen, Præop - På operationsdag Indikationer: tromboseprofylakse
 - ☐ dalteparin injektion, sprøjte
5.000 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Morgen, Postop - Opvågning og afdeling Indikationer: tromboseprofylakse
 - ☐ enoxaparin / ghemaxan injektion, sprøjte

2. Modulet virker når hele sættes signeres som vanligt.
3. Der vises et pop-up vindue som giver muligheden for at erstatte best./ord. fra det respektive best./ord, som vil blive anvendt i DanHep forskningsprojektet. Den nye best./ord. vil have samme behandlingsfaser og frekvens specificeret som tidligere.

Vigtigt (3)

📌 **Klyngerandomisering af lavmolekylært heparin**

Patienten inkluderes i **DANHEP** og randomiseres til enten **Dalteparin (Fragmin)** eller **Tinzaparin (Innohep)**

Se mere information på www.danhep.com

Den nye Best./ord vil have den ækvivalente dosis og samme behandlingsfase, som specificeret i den oprindelige ordination. Ved inklusion af patient, fjernes den oprindelige best./ord.

📌 **Præop - på Operationsdag, Tinzaparin (Innohep) 3500 IE**

Best./ord. Undlad at best./ord. Præop - på operationsdag

Afvisningsårsag

Læge ønsker ikke at inkludere Patient har trukket samtykke tilbage Patient er varigt inhabil Andet

📌 **Hvis du har markeret "Undlad at best./ord" ovenfor, husk da at markere "Behold" nedenfor**

Fjern følgende best./ord.?

Fjern Behold tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Morgen, Første dosis i morgen kl. 08:00, Sidste dosis s...

Tilsidesættelsesårsag

Læge ønsker ikke at inkludere Patient har trukket samtykke tilbage Patient er varigt inhabil Andet

✓ Acceptér Annuller

Ryd alle best./ord Signér

↑ Forrige ↓ Næste

- Der skal ikke foretages yderligere ændringer, blot trykkes på knappen 'Acceptér'.
- Når pop-up vinduet accepteres, accepteres det foreslåede best./ord.
- Herefter vises ordinationsættet med mulighed for at foretager ændringer i dosis mm.
- Som standard fjernes det oprindelige best./ord, og dermed undgås dobbeltordinationer.

▼ **Tromboseprofylakse**

✓ tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Morgen, Første dosis i morgen kl. 08:00, Sidste dosis sen. 13-04 kl. 08:00, Præop - På operationsdag
Indikationer: tromboseprofylakse
Signer & tilbagehold

✓ Acceptér ✗ Annuller

Best./ord.-anvisninger: Terapeutisk dosis 175 anti-Xa-IE/kg

Referencelink: • IV-vejledningen • Doseringstabel 1 gang dagligt • pro medicin • Doseringstabel 2 gange dagligt • Interaktioner

Indikationer: ✖ tromboseprofylakse

Dosis: 3.500 anti-Xa IE 2.500 anti-Xa IE 3.500 anti-Xa IE 4.500 anti-Xa IE 8.000 anti-Xa IE 10.000 anti-Xa IE 12.000 anti-Xa IE 14.000 anti-Xa IE 16.000 anti-Xa IE 18.000 anti-Xa IE
20.000 anti-Xa IE

Beregnet dosis: 1 sprøjte

Doser over døgnet: Ja Nej

Produkt: TINZAPARIN INJ.VSK.OPL.,SPRØJTE 3.500 ANTI-XA IE

Adm. vej: Subkutan anvendelse Subkutan anvendelse Intravenøs anvendelse

Frekvens: Morgen Kun én gang Morgen Aften (kl. 20) Nat

Med start: 11-04-2025 I dag I morgen Til: 3 Dosertimer Dage

Første dosis: Inkluder nu Som planlagt

Første dosis: 11.04 08:00 12.04 08:00 13.04 08:00 Ferste dosis: I morgen 08:00 Sidste dosis: sen. 13-04 08:00 Antal doser: 3

Adm. anvisninger: + Tilføj Adm.anvisninger
☐ Ej substitution

✖ Yderligere best./ord.-detaljer

✓ Acceptér ✗ Annuller

Afvisning af forskningsprojektet

I tilfælde af, at det ikke ønskes at inkludere patienten i forskningsprojektet.

1. Tryk på 'undlad at best./ord'.
2. Vælg herefter en afvisningsårsag.
3. Tilføj en kommentar med den relevante afvisningsårsag.
4. Tag herefter stilling til, hvorvidt det ønskes at fjerne eller beholde den oprindelige ordination for det lavmolekylære heparin.
5. Hvis det ønskes at fjerne best./ord, vælges en tilsidesættelsesårsag samt tilføjes en kommentar.
6. Tryk herefter acceptér. Patienten deltager ikke i DanHep forskningsprojektet.

Vigtigt (3)

❗ **Klyngerandomisering af lavmolekylært heparin**

Patienten inkluderes i DANHEP og randomiseres til enten Dalteparin (Fragmin) eller Tinzaparin (Innohep)

Se mere information på www.danhep.com

Den nye Best./ord vil have den ækvivalente dosis og samme behandlingsfase, som specificeret i den oprindelige ordination. Ved inklusion af patient, fjernes den oprindelige best./ord.

❗ **Præop - på Operationsdag, Tinzaparin (Innohep) 3500 IE**

Best./ord. **Undlad at best./ord.** Præop - på operationsdag

Afvisningsårsag

Læge ønsker ikke at inkludere Patient har trukket samtykke tilbage Patient er varigt inhabil Andet

Afvisningsårsag skrives her |

❗ **Hvis du har markeret "Undlad at best./ord" ovenfor, husk da at markere "Behold" nedenfor**

Fiern følgende best./ord.?

Fjern Behold **tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte**
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Morgen, Første dosis i morgen kl. 08:00, Sidste dosis s...

Tilsidesættelsesårsag

Læge ønsker ikke at inkludere Patient har trukket samtykke tilbage Patient er varigt inhabil Andet

✓ Acceptér Annuller

Fjern	Behold
Fjern	Behold