

Danhep - Brugsanvisning

Accept af studiet

Modulet virker når best/ord placeres via et ordinationsæt med behandlingsfaser.

1. Når et ordinationsæt bruges og Innohep/fragmin vælges

Best/ord.-sæt

✓ ringer-acetat infusion
1.000 ml, Intravenøs anvendelse, efter behov kun én gang, Med start i dag kl. 02:30, Indtil fre. 10-11 kl. 02:30
Indikationer: til væsketerapi

✓ NaCl isoton infusion
1.000 ml, Intravenøs anvendelse, efter behov kun én gang, Med start i dag kl. 02:30, Indtil fre. 10-11 kl. 02:30
Indikationer: til væsketerapi

□ Humant albumin infusion
250 ml, Intravenøs anvendelse, Kun én gang, Starter 08-11-23 Indikationer: behandling af hypovolemie og chok

▼ Lægemidler

▼ AHA Medicin (ingen penicillinallergi)

OBS!! Er der opstartet antibiotika?

✓ ondansetron 2 mg/ml injektion
4 mg, Intravenøs anvendelse, efter behov højst 4 gange dagligt, Med start i dag kl. 02:30, Indtil seponeret, Fortsætte til seponering
Brugsfærdig opløsning 2 mg/ml. Gives over 2-5 minutter
Indikationer: mod kvalme

✓ morfin 10 mg/ml injektion
5 mg, Intravenøs anvendelse, efter behov højst 6 gange dagligt, Med start i dag kl. 02:30, Indtil seponeret, Der kan gives 5 - 10 mg pr. gang, kan gives subcutant
Indikationer: mod smerter

✓ tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Kun én gang, i dag kl. 02:31, Præop - På operationsdag
Indikationer: tromboseprofylakse
Signer & tilbagehold

✓ tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, aften, Første dosis i dag kl. 02:31, Indtil seponeret, Postop - Opvågning og afdeling
Indikationer: tromboseprofylakse
Signer & tilbagehold

Håndter best/ord. Best/ord.-sæt Valgmuligheder

Ressourcer Rediger flere

Afgiv best/ord., best/ord.-sæt eller forløb + Ny Næste

Best/ord. fra best/ord.-sæt

Ahh kir AHA operation
TEG
Tages af rekvirenten (Indlagt), En gang, i dag kl. 02:31, Til 1 forekomst, Fremskyndet, Præop - På operationsdag, Signer & tilbagehold

Klorid-P
Tages af rekvirenten (Indlagt), En gang, i dag kl. 02:31, Til 1 forekomst, Fremskyndet, Præop - På operationsdag, Signer & tilbagehold

BAC-test-B
Tages af rekvirenten (Indlagt), En gang, i dag kl. 02:31, Til 1 forekomst, Fremskyndet, Præop - På operationsdag, Signer & tilbagehold

PROFIL: Sporstoffer
Denne bestilling udløser disse analyser: Fosfat, Magnesium, Zink.
Tages af rekvirenten (Indlagt), En gang, i dag kl. 02:31, Til 1 forekomst, Fremskyndet, Præop - På operationsdag, Signer & tilbagehold

Bilirubin-P
Tages på runde, Morgenrunde (Daglig), Første forekomst i dag kl. 07:30, Sidste forekomst sam. 12-11 kl. 07:30, Til 5 forekomster, Fremskyndet, Postop dag 1, Signer & tilbagehold

Alanintransaminase [ALAT]P
Tages på runde, Morgenrunde (Daglig), Første forekomst i dag kl. 07:30, Sidste forekomst sam. 12-11 kl. 07:30, Til 5 forekomster, Fremskyndet, Postop dag 1, Signer & tilbagehold

2. Modulet virker når hele sættet signeres

Best practice-advisering - Damgård, KIK Nix Pille

Vigtigt (4)

⚠ Klyngerandomisering af lavmolekylær heparin

Patientens data inkluderes i DANHEP

Patienten behandles med:

Tinzaparin (Innohep s.c.)

Husk at verificere vægt, hvis der er tale om behandling VTE.

⚠ Præop tinzaparin (innohep) 3500 IE

Best/ord. Undlad at best/ord. Abdominal kirurgi: Præop - På operationsdag

⚠ Postop tinzaparin (innohep) 3500 IE

Best/ord. Undlad at best/ord. Abdominal kirurgi POSTOP - opvågning og afdeling

⚠ Hvis du har accepteret at inkludere patientens data skal den oprindelig best/ord fjernes nedenfor

Fjern følgende best/ord.?

Fjern	Behold	tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte
☐	☐	3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Kun én gang, i dag kl. 02:31, Præop - På operationsdag
☐	☐	3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, aften, Første dosis i dag kl. 02:31, Indtil seponeret, Postop - Opvågning og afdeling

Afvisningsårsag

Læge ønsker ikke at inkludere Patient har trukket samtykke tilbage Patient er varigt inhabil Andet

✓ Acceptér Annuller

tyggegummi
time, Med start i dag kl. 02:30, Indtil seponeret, Postop dag 1

scillin i NaCl isoton infusion
1 én gang, Starter 08-11-23, Præop - På operationsdag Indikationer: mod intraabdominal infektion

Håndter best/ord. Best/ord.-sæt Valgmuligheder

Ressourcer Rediger flere

Afgiv best/ord., best/ord.-sæt eller forløb + Ny Næste

Indikationer: til væsketerapi

NaCl isoton infusion
1.000 ml, Intravenøs anvendelse, efter behov kun én gang, Med start i dag kl. 02:30, Indtil fre. 10-11 kl. 02:30
Indikationer: til væsketerapi

ondansetron 2 mg/ml injektion
4 mg, Intravenøs anvendelse, efter behov højst 4 gange dagligt, Med start i dag kl. 02:30, Indtil seponeret, Fortsætte til seponering
Brugsfærdig opløsning 2 mg/ml. Gives over 2-5 minutter
Indikationer: mod kvalme

morfin 10 mg/ml injektion
5 mg, Intravenøs anvendelse, efter behov højst 6 gange dagligt, Med start i dag kl. 02:30, Indtil seponeret, Der kan gives 5 - 10 mg pr. gang, kan gives subcutant
Indikationer: mod smerter

tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Kun én gang, i dag kl. 02:31, Præop - På operationsdag
Indikationer: tromboseprofylakse
Signer & tilbagehold

tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, aften, Første dosis i dag kl. 02:31, Indtil seponeret, Postop - Opvågning og afdeling
Indikationer: tromboseprofylakse
Signer & tilbagehold

paracetamol tablet
1.000 mg, Oral anvendelse, Morgen, middag, aften og nat, Første dosis i dag kl. 08:00, Indtil seponeret, Postop - Opvågning og afdeling
Kan gives som brusetablet eller supp.
Indikationer: mod smerter
Signer & tilbagehold

morfin tablet
10 mg, Oral anvendelse, efter behov højst 6 gange dagligt, Med start i dag kl. 02:30, Indtil seponeret, Postop - Opvågning og afdeling
Indikationer: mod stærke smerter
Signer & tilbagehold

V6 DENTAL TYGGE GUMMI medicinsk
tyggegummi
1 stk, Oral anvendelse, efter behov hver 3. time, Med start i dag kl. 02:30, Indtil seponeret, Postop dag 1

Fjern alle Gem kladder Signér

3. Pop-up vinduet giver muligheden for at erstatte best/ord fra det respective best/ord, hvilket vil blive brugt i DANHEP projektet. Den nye best/ord vil have de same behandlingfaser specificeret.
4. Accepter begge foreslåede best/ord.
5. Og verificer and begge oprindelige best/ord bliver fjernet

Best practice-advisering - Damgård, KIK Nix Pille

Vigtigt (4)

❗ **Klyngerandomisering af lavmolekulær heparin**

Patientens data inkluderes i DANHEP

Patienten behandles med:

Tinzaparin (Innohep s.c.)

Husk at verificere vægt, hvis der er tale om behandling VTE.

❗ Præop tinzaparin (innohep) 3500 IE

Best./ord. Undlad at best./ord. [Abdominal kirurgi. Præop - På operationsdag](#)

❗ Postop tinzaparin (innohep) 3500 IE

Best./ord. Undlad at best./ord. [Abdominal kirurgi POSTOP - opvågning og afdeling](#)

❗ **Hvis du har accepteret at inkludere patientens data skal den oprindelig best/ord fjernes nedenfor**

Fjern følgende best./ord.?

Fjern	Behold	tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte 3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Kun én gang, i dag kl. 02:31, Præop - På operationsda...
Fjern	Behold	tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte 3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, aften, Første dosis i dag kl. 02:31, Indtil seponeret, Po...

Afvisningsårsag

Læge ønsker ikke at inkludere Patient har trukket samtykke tilbage Paatient er varigt inhabil Andet

✓ Acceptér Annuller

6. Accepter og verificere den nye best/ord. De nye best/ord er ikke en del af ordinationssættet og bliver vist i toppen af andre ordinationer for at gøre det lettere at verificere dosis og andet specificeret information.

The screenshot shows a medical form for 'tinzaparin 2.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte'. The form is divided into several sections: 'Best/ord-anvisninger' (Therapeutic dose 175 anti-Xa-IE/kg), 'Referencelink' (IV-vejledninger, Doseringstabel 1 gang dagligt, Doseringstabel 2 gange dagligt, Interaktioner), 'Indikationer' (tromboseprofylakse), 'Dosis' (2.500 anti-Xa IE), 'Beregnet dosis' (0,25 ml), 'Doser over døgnet' (Ja/Nej), 'Produkt' (TINZAPARIN INJ.VSK.OPL.SPRØJTE 2.500 ANTI-XA IE), 'Adm.vej' (Subkutan anvendelse, Subkutan anvendelse, Intravenøs anvendelse), 'Frekvens' (Kun én gang, Kun én gang, Morgen, Aften (kl. 20), Nat), 'Tidspunkt' (08-11-2023, I dag, I morgen, 02:46), 'Adm.anvisninger' (Tilføj Adm.anvisninger, Ej substitution, Selv-administreret, patientmedbragt, doser), 'Hastighed' (ml/time), 'Adm.varighed' (), and 'Behandlingsfase' (Præop - På operationsdag). A sidebar on the right shows a list of orders and a summary of the patient's condition.

Afvisning

I tilfælde af du ikke vil inkludere en patient

1. Vælg ikke de foreslåedes best/ord. De skal være markeret med "undlad at best/ord" som vist i nedenstående:

The screenshot shows two forms: 'Præop tinzaparin (Innohep) 3500 IE' and 'Postop tinzaparin (Innohep) 3500 IE'. Each form has a 'Best/ord.' button and an 'Undlad at best/ord.' button. Red arrows point to the 'Undlad at best/ord.' buttons.

2. Vælg afvisningsårsag og kommenter.
3. Vær sikker på at alt originalt medicin du har valgt er markeret som behold. Det sker automatisk når afvisningsårsag specificeres. Men vær opmærksom på at begge skal være markeret "behold".
4. Tryk på accepter knappen, som bliver aktiveret når kommentaren er indtastet. Patienten er herved ekskluderet fra studet og du kan fortsætte med ordinationssættet som vanligt.

OBS! Brug ikke annuller knappen. Den ekskluderer ikke patienten og pop-up vinduet vil komme igen når du signerer ordinationen. Følg step 1-4 i afvisning workflow som er beskrevet oven for.

Eksempel på hvordan afvisning skal sættes op:

Best practice-advisering - Damgård, KIK Nix Pille

Vigtigt (4)

! Klyngerandomisering af lavmolekulær heparin

Patientens data inkluderes i DANHEP

Patienten behandles med:

Tinzaparin (Innohep s.c.)

Husk at verificere vægt, hvis der er tale om behandling VTE.

! Præop tinzaparin (innohep) 3500 IE

Best./ord.

Undlad at best./ord.

Abdominal kirurgi. Præop - På operationsdag

! Postop tinzaparin (innohep) 3500 IE

Best./ord.

Undlad at best./ord.

Abdominal kirurgi POSTOP - opvågning og afdeling

! Hvis du har accepteret at inkludere patientens data skal den oprindelig best/ord fjernes nedenfor

Fjern følgende best./ord.?

Fjern

Behold

tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, Kun én gang, i dag kl. 02:49, Præop - På operationsda...

Fjern

Behold

tinzaparin 3.500 anti-Xa IE injektion, sprøjte
3.500 anti-Xa IE, Subkutan anvendelse, aften, Første dosis i dag kl. 02:49, Sidste dosis man. 1...

Afvisningsårsag

Læge ønsker ikke at inkludere

Patient har trukket samtykke tilbage

Paatient er varigt inhabil

Andet



Indtast kommentar

✓ Acceptér

Annuller